

Beleid bij patiënten met registratie van allergie voor penicillines en onmiddellijke noodzaak tot behandeling met BL antibiotica in het geval verwijzing naar allergoloog niet haalbaar is.

Type reactie	Ernst	Datum optreden reactie	Toegestane BLA onder supervisie
Acuut	Ernstig		<ul style="list-style-type: none"> • Vermijd alle penicillines • I.g.v. allergie voor benzylpenicilline of amoxicilline vermijd ook groep A cefalosporinen (zie tabel kruisallergie) • Toegestaan* zijn groep (A),B,C,D,E cefalosporinen, carbapenems, monobactam (zie tabel kruisallergie)
	Niet ernstig	<= 5 jaar geleden	
		> 5 jaar geleden	Toegestaan zijn alle beta-lactam antibiotica*
Niet-acuut	Ernstig		Vermijd alle beta-lactam antibiotica
	Niet ernstig	<= 1 jaar geleden	<ul style="list-style-type: none"> • Vermijd alle penicillines • I.g.v. allergie voor benzylpenicilline of amoxicilline vermijd ook groep A cefalosporinen (zie tabel kruisallergie) • Toegestaan zijn groep (A),B,C,D,E cefalosporinen, carbapenems, monobactam (zie tabel kruisallergie)
		> 1 jaar geleden	Toegestaan zijn alle beta-lactam antibiotica
Geen informatie beschikbaar (wel anamnese mogelijk)	Onbekend	Onbekend	Toegestaan zijn alle beta-lactam antibiotica

*) Observatie van patiënt gedurende tenminste 1 uur en noodmedicatie onder handbereik