

ERNSTIGE ALLERGIE

Ernstig, acuutKliniek passend bij ernstige acute allergische reactie (anafylaxie)

- Acuut en tegelijkertijd of kort na elkaar ontstaan van symptomen uit minimaal 2 verschillende orgaansystemen:
 - Huid en slijmvliezen: gegeneraliseerde jeuk, urticaria, erytheem of angio-oedeem
 - Bovenste en onderste luchtwegen: droge hoest, keelschrapen, dikke keel, benauwd, piepen
 - Maagdarmkanaal: misselijkheid, braken, buikpijn of diarree
 - Bloedcirculatie: systolisch bloeddruk < 90 mmHg of > 30% afname van systolische bloeddruk
- Of lage bloeddruk (systolisch < 90 mmHg of 30% daling) < 2 uur na blootstelling aan waarschijnlijk allergeen

Ernstig, niet-acuutKliniek passend bij ernstige, niet-acute allergische reactie: Severe Cutaneous Reaction (SCAR) zoals AGEP, DRESS, SJS/TEN:

- huiduitslag in combinatie met alarmsymptomen
 - Koorts, lymfadenopathie, hepatosplenomegalie
 - Blaren, pustels, vasculitis, purpura
 - Verhoogde transaminasen, eosinofilie, leukopenie, proteïnurie, laag complement
- (verlengde) opname als gevolg van reactie
- Blijvende schade als gevolg van reactie

NIET-ERNSTIGE ALLERGIE

(Datum waarop reactie plaatsvond bepaalt het beleid)

Niet-ernstig, acuutKliniek passend bij niet-ernstige acute allergische reactie

- Urticaria zonder betrokkenheid van een ander orgaansysteem
 - Begin symptomen < 6 uur na inname of reactie op eerste dag van inname geneesmiddel
 - Duur symptomen < 24 uur

**Niet-ernstig,
niet-acuut**Kliniek passend bij niet-ernstige, niet-acute allergische reactie

- Huiduitslag (meestal maculopapuleus exantheem) zonder alarmsymptomen
- Begin huidsymptomen > 6 uur tot 2 weken (meestal 3 -10 dagen) na inname geneesmiddel
- Duur huiduitslag > 2 dagen