


Tabel kruisallergie. In Nederland gebruikte beta-lactam antibiotica ingedeeld in groepen waarbinnen verhoogde kans op kruisallergie bestaat

Penicillines	Cefalosporines (generatie)					Carbapenems	Monobactam
	Groep A	Groep B	Groep C	Groep D	Groep E		
Amoxicilline ^{#)} (/clavulaanzuur)	Cefalexine ^{#)} (1 ^e)	Cefazolin (1 ^e)	Ceftibuten (3 ^e)	Cefuroxim (2 ^e)	Ceftolozane (/tazobactam) (5 ^e)	Meropenem	Aztreonam ^{*)}
Benzyl- penicilline ^{#)}	Cefaclor ^{#)} (2 ^e)			Ceftriaxon (3 ^e)		Ertapenem	
Flucloxacilline	Cefamandol ^{#)} (2 ^e)			Cefotaxim (3 ^e)			
Piperacilline (/tazobactam)				Ceftazidim ^{*)} (3 ^e)			
		Cefiderocol ^{*)} (4 ^e)					

 ^{#)} De penicillines benzylpenicilline (penicilline V/G) en amoxicilline en de cefalosporines cefaclor, cefalexine en cefamandol hebben vergelijkbare zijketens en IgE en T-cel gemedieerde kruisallergie is aangetoond

 ^{*)} Ceftazidim, cefiderocol en aztreonam hebben identieke zijketen en IgE gemedieerde kruisallergie is aangetoond voor ceftazidim/aztreonam